

BAUSCH + LOMB

ReNu® MultiPlus
Раствор универсальный

ПОКАЗАНИЯ: Для ежедневной очистки, дезинфекции и удаления белковых отложений выполните эти простые действия.

ШАГ 1: Нанесите по 3 капли универсального раствора ReNu® MultiPlus на каждую сторону линзы с помощью кончика пальца.

ШАГ 2: Тщательно промойте линзы с каждой стороны в течение 5 секунд универсальным раствором ReNu® MultiPlus.

ШАГ 3: Поместите очищенные контактные линзы в футляр для линз и залейте свежим универсальным раствором ReNu® MultiPlus. Оставьте линзы в растворе минимум на 4 часа. Всегда используйте свежий раствор.

ВАЖНО: Для полного использования. Промывка физиологическим раствором не требуется. Если на контактных линзах осталась загрязненность, промойте их универсальным раствором ReNu®, прежде чем надеть.

ВАЖНО: Контактные линзы с покрытием. В зависимости от индивидуального химического состава вашей слезной жидкости и графика ношения линз вам может потребоваться дополнительное средство или процедура.

ВАЖНО: Линзы можно хранить в контейнере для линз до момента использования в течение максимум 30 дней.

СОСТАВ: Стерильный изотонический раствор, содержащий HYDRANAT™ (0.03 % гидроксидный аммоний, гидроксиэтанол, динатрий ацетат, 1 % поливинилпирролидон), борат натрия и аллоид натрия; консерванты: DIMED® (0.0011 % поливинилпирролидон бигуанид).

ДЕЙСТВИЕ: Очищает, разрыхляет и удаляет скопления белка, белковых и других отложений и загрязнений с мягких контактных линз. Уничтожает вредные микроорганизмы на поверхности линз.

Обеспечивает промывку, хранение и увлажнение линз до момента использования.

Раствор универсальный BAUSCH + LOMB ReNu® MultiPlus показан для ежедневной очистки, увлажнения белковых отложений, промывки, химической (не тепловой) дезинфекции и хранения линз (гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями вашего окулиста. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** (исноования для запрета использования): Если у вас есть аллергия на какой-либо компонент этого продукта, не используйте его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ И СРЕДСТВАМИ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИНЗАМИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИНФЕКЦИИ ИЛИ ЯЗВЕ РОГОВИЦЫ, А ТАКЖЕ К ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ

Для правильного использования линз в средстве по уходу за линзами, в том числе контейнера для линз, обязательно следуйте указаниям вашего окулиста и всеи инструкции на упаковке.

Проблемы с глазами. Всегда обращайтесь к врачу, чтобы быстро диагностировать и привести к потере зрения (слепоте). Линзы для дневного ношения не предназначены для круглосуточного применения. Невыявленная в линзах. Клинические исследования показали, что риск серьезных осложнений серьезных заболеваний увеличивается по мере увеличения времени ношения линз.

Исследования также показали, что риск серьезных осложнений серьезных заболеваний увеличивается по мере увеличения времени ношения линз. Исследования также показали, что у курильщиков нежелательные реакции возникают чаще. Если вы испытываете дискомфорт при использовании контактных линз, немедленно прекратите их использование, немедленно снимите линзы и обратитесь к окулисту. Пользователи контактных линз рекомендуется посещать своего окулиста два раза в год или чаще в соответствии с показаниями.

ВАЖНО: ЧИСТЫЕ И ХРАНИТЬ ЛИНЗЫ

• Нанесите контейнер для линз свежим раствором каждый раз при поминении линзы на хранение и никогда не используйте повторно и не используйте его повторно. Необходимо использовать свежий раствор сразу же после окончания использования.

• Не подгревайте ваши линзы воздействием водопроводной, бутылированной или дистиллированной воды или какого-либо нестерильного раствора, не храните и не промывайте линзы в горячей воде.

УХОД ЗА КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ЛИНЗ:

• Каждый раз после извлечения линз из футляра очисти и промойте футляр для линз универсальным раствором ReNu® MultiPlus с последующей сушкой на воздухе. Чтобы избежать роста плесени, во время сушки на воздухе футляр для линз можно перевернуть. Регулярно мойте футляр для линз в зависимости от ваших гигиенических привычек.

• Если после каждого использования не снимать раствор из футляра для линз, пополнить раствор или использовать обычную воду для ухода за линзами, это может привести к загрязнению, последующей травме глаза и потере зрения линзы.

• Полностью соблюдайте указания на этикетке рекомендации о времени для промывки и промывания линз, а также указания по использованию раствора для линз в случае их загрязнения. При сокращении времени дезинфекции раствора линзы могут вызвать риск сохранения остаточных загрязнений на линзах.

• Никогда не используйте воду, физиологический раствор или увлажняющие капли для контактных линз. Эти растворы не обеспечивают надлежащую дезинфекцию линз.

Использование рекомендованного дезинфицирующего средства может привести к серьезной инфекции, повреждению или слепоте.

• Не храните линзы в воде или каком-либо нестерильном растворе и не промывайте контейнер для линз раствором только свежий универсальный раствор, чтобы не загрязнить свои линзы или контейнер для линз. Использование нестерильного раствора может привести к серьезной инфекции, повреждению или слепоте.

• Использование раствора после даты истечения срока годности может привести к загрязнению раствора и серьезной инфекции, повреждению или слепоте.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Всегда соблюдайте инструкции по применению раствора. Несоблюдение таких инструкций может привести к повреждению (слепоте).

• Посещайте своего окулиста два раза в год или чаще в соответствии с показаниями.

• При очистке и дезинфекции контактных линз используйте только свежий раствор.

• Всегда утилизируйте остатки раствора в футляре для линз после каждого цикла дезинфекции.

• Физиологический раствор или увлажняющие капли не обеспечивают надлежащую дезинфекцию линз.

• Всегда закрывайте раствор, линзы и футляр для линз в соответствии с указаниями.

• Во избежание загрязнения не прикасайтесь крямей контейнера к какой-либо поверхности. После использования контейнера всегда закрывайте его крышкой.

• Не используйте никакие лекарственные препараты для глаз вместе с этим раствором без наблюдения врача.

• Не используйте раствор вместе с тепловой (термической) дезинфекцией.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

• Когда флакон не используется, храните его плотно закрытым.

• Используйте раствор до истечения срока годности, указанного на упаковке и флаконе.

• Утилизировать оставшийся раствор в течение 90 дней после открытия.

• Храните раствор в недоступном для детей месте.

• Храните раствор при комнатной температуре.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В случае возникновения, сохранения или усиления раздражения или воспаления немедленно обратитесь к окулисту.

• Нежелательные реакции (раздражение и слезотечение):

• Нежелательные реакции, которые могут возникнуть, включают зуд, покраснение, жжение, зуд (раздражение) или другие боли в глазу.

• Ношение линзы стало менее комфортным по сравнению с ощущением при первом ношении линзы.

• Максимальное ощущение зуда (напряжения) ощущение раздражения, покраснения или боли.

• Чрезмерное слезотечение (слезоотделение) или необычные выделения из глаза.

• Покраснение глаз.

• Сильное ощущение зрения (похожее ощущение, радужные круги или ореолы вокруг предметов).

• Чувствительность к свету (светобоязнь).

Если вы заметили что-либо из вышеперечисленного, немедленно снимите линзы. Если дискомфорт или проблема исчезнет, внимательно осмотрите линзы.

• Если симптомы сохраняются, немедленно обратитесь к окулисту. Поместите линзу в контейнер для хранения и обратитесь к врачу окулисту.

• Если на линзе имеется грязь, ресница или другое инородное тело, или проблема исчезнет и линза снова надеться.

• Если проблема не исчезнет, немедленно снимите линзы и обратитесь к своему окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

• Если вы заметили зуд, жжение или раздражение в области проблемного глаза, немедленно обратитесь к окулисту.

ВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАБЕРЕЖИТЕ ЭТУ ЛИСТОВКУ-ВКЛАДКУ ДЛЯ ПОДАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

BAUSCH + LOMB

Багатоцільовий розчин
ReNu® MultiPlus (МультіПлюс)

УКАЗІВКИ: Для щоденного очищення, дезінфекції та видалення білкових відкладень виконуйте ці прості дії.

ШАГ 1: Нанесіть по 3 краплі багатоцільового розчину ReNu® MultiPlus (МультіПлюс) на кожну поверхню линзи та обережно протрийте протягом 20 секунд.

ШАГ 2: Ретельно промийте кожну поверхню линзи протягом 5 секунд багатоцільовим розчином ReNu® MultiPlus (МультіПлюс).

ШАГ 3: Показати очищені контактні линзи у контейнері для линз і наповнити його свіжим багатоцільовим розчином ReNu® MultiPlus (МультіПлюс). Замочте не менше ніж на 4 години.

ВАЖНО: Для повного використання. Промивка фізіологічним розчином не потрібна.

Тепер ваші линзи готові до носіння. Не тріть, промивайте линзи соловим розчином. Якщо на контактних линзах залишилося чужорідне тіло, перед надіванням промийте багатоцільовим розчином ReNu® MultiPlus (МультіПлюс).

ВАЖНО: Контактні линзи з покриттям. Залежно від індивідуального хімічного складу вашої слези і режиму носіння линз, вам може знадобитися додаткова процедура.

ВАЖНО: Контактні линзи можна зберігати в контейнері для линз до моменту надівання не більше 30 днів.

СОСТАВ: Стерильний, ізотонічний розчин, що містить ПІДРАНАТ™ (гідроксидний амоній) 0,03%, борну кислоту, диметил едет, поліоксидант 1%, борат натрію та хлорид натрію; з додаванням консервантів: ДІМЕД® (поліамінопропіл бигуанід) 0,0011%.

ДЕЙСТВИЄ:

Очищає, розпушує, видаляє накопичення біоплівки, білки, інші відкладення та чужорідні речовини та линзи на м'яких контактних линзах. Забезпечує надійну мікроциркуляцію на поверхні линзи.

Обеспечивает промывку, хранение и увлажнение линз до момента использования.

Розчин універсальний BAUSCH + LOMB ReNu® MultiPlus показаний для щоденного очищення, видалення білкових відкладень, промивання, хімічної (не теплової) дезинфекції та зберігання м'яких (гідрофільних) контактних линз відповідно до рекомендацій вашого окулиста.

ПРОТИВОПОКАЗАННЯ (причини не використовувати): Якщо у вас алергія на якийсьбудь компонент багатоцільового розчину, не використовуйте його.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ З КОНТАКТНИМИ ЛИНЗАМИ ТА УДОКРЕННЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НИМИ МОЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО ІНФЕКЦІЙНОГО РОГОВИТТА ТА/БО УТВОРЕННЯ ВИРАЗИМІ І ВТРАТИ ЗОРУ (СЛЕПОТІ).

Важливо, щоб ви дотримувалися вказівок лікаря-офтальмолога та вживали всі рекомендації, які містяться в інструкції, для правильного використання ліній і продукції з догляду за линзами, включаючи контейнер для линз.

Проблеми з очима, пов'язані з використанням гоігма, можуть швидко розвиватися і призводять до втрати зору (сліпоті). Якщо у вас одностороннє носіння не призначено для використання вночі, їх не можна використовувати після заходу сонця.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації та заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Результати клінічних досліджень показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

Дослідження показали, що ризик виникнення серйозних побічних реакцій збільшується, якщо використовувати линзи вночі. Якщо для триденного носіння слід регулярно знимати для очищення і дезінфекції або для утилізації чи заміни відповідно до терміну, вказаного на упаковці.

