

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
КЛЕЙ БФ-6



**Регистрационный номер:** ЛП-008270

**Торговое наименование:** КЛЕЙ БФ-6

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения спиртовой

**Состав на 1 г:**

*Действующее вещество:*

Фенолформальдегидная смола  
(лак бакелитовый) 16,5 мг

*Вспомогательные вещества:*

Поливинилбутирал 97,0 мг

Дибутилфталат 35,0 мг

Клецевины обыкновенной семян масло 17,5 мг

Канифоль 8,5 мг

Этанол 95 % (спирт этиловый 95 %) 825,5 мг

**Описание:** прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** D08AE

**Фармакологические свойства:**

Оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей плёнки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.

**Показания к применению:**

Препарат применяют для обработки микротравм (ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи), послеоперационных швов.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 1 года.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

На основании существующих данных, применение в терапевтических дозах при беременности не оказывает отрицательного влияния на развивающийся плод.



Перед применением препарата, если вы беременны, или предполагаете, что вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможно применение в период грудного вскармливания. Перед применением в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Наружно.

Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнения. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое необходимо покрыть клеем. Препарат наносят непосредственно на поврежденную поверхность тонким слоем, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки сверху на нее наносят новую пленку. Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается



на коже на протяжении 2-3 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

**Побочное действие:**

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка:**

Случаи передозировки не описаны.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные о нежелательных проявлениях лекарственного взаимодействия отсутствуют.

**Особые указания:**

Препарат предназначен только для наружного применения.

Избегать попадания на слизистые оболочки глаз.

Не отмечено влияние применения препарата на течение хронических заболеваний.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

**Форма выпуска:**

Раствор для наружного применения спиртовой. По 5, 10, 15, 25 и 40 г в тубы алюминиевые в комплекте с колпачками полимерными, или в тубы алюминиевые в комплекте с бушонами полимерными, или в тубы алюминиевые

в комплекте с колпачками-бушонами полимерными, или в тубы алюминиевые в комплекте с бушонами полимерными, или в тубы из комбинированного материала в комплекте с бушонами полимерными.

По 5, 10 и 30 г во флаконы-капельницы с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полимерными и навинчиваемыми крышками полимерными. На флаконы-капельницы наклеивают этикетки.

Каждую тубу или флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац.

**Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, вдали от источников нагрева и открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

4 года. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения:**

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

**Организация, принимающая претензии:**

ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07 (846) 373-81-08.

**Адрес места производства:**

Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б; Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

