

Листок-вкладыш – информация для потребителя

Гербион® плющ пастилки, 35 мг
Hederae helicis folium

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с данным листком-вкладышем или с назначением врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Вы должны обратиться к врачу, если через 7 дней лечения не почувствовали улучшение или стали чувствовать себя хуже.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Гербион® плющ пастилки, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Гербион® плющ пастилки.
3. Применение препарата Гербион® плющ пастилки.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гербион® плющ пастилки.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ГЕРБИОН® ПЛЮЩ ПАСТИЛКИ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Гербион® плющ пастилки – лекарственный препарат растительного происхождения, применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся продуктивным кашлем.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® ПЛЮЩ ПАСТИЛКИ

Не принимайте Гербион® плющ пастилки:

- Если у вас аллергия на сухой экстракт листьев плюща или другие растения семейства аралиевых (*Araliaceae*) или на любое из вспомогательных веществ препарата (перечислены в разделе 6);
- Препараты плюща нельзя принимать детям младше 2 лет из-за риска ухудшения респираторных симптомов, связанного с лекарствами от кашля, которые действуют путем разжижения слизи в дыхательных путях.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Гербион® плющ пастилки проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

- Если у вас появились затруднение дыхания, лихорадка или содержащая гной мокрота, вам следует проконсультироваться с врачом или работником аптеки.

- Если симптомы заболевания не улучшаются через 7 дней использования препарата, следует обратиться к врачу.
- Не рекомендуется без консультации врача принимать данный препарат совместно с другими средствами, которые подавляют кашель (противокашлевые средства, такие как кодеин или дексетрометорфен).
- Препарат следует применять с осторожностью, если у вас проблемы с желудком (стадия обострения гастрита, язвы желудка).

Препарат не содержит сахар и может приниматься пациентами с диабетом.

Применение у детей

Не используйте препараты плюща у детей в возрасте до 2 лет. Применение препарата Гербион® плющ в форме пастилок у детей от 2 до 5 лет не рекомендуется, так как лекарственная форма пастилки не позволяет адаптировать дозу под возраст. Для данной возрастной группы при необходимости рекомендуется принимать препарат в виде сиропа.

Другие препараты и Гербион® плющ пастилки

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Не было сообщений о влиянии сухого экстракта листьев плюща на действие других препаратов.

Гербион® плющ пастилки с пищей, напитками и алкоголем

Гербион® плющ пастилки не должны приниматься непосредственно перед или во время приема пищи.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки перед началом приема препарата.

В связи с отсутствием достаточных данных прием лекарственного препарата во время беременности и лактации не рекомендован.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Гербион® плющ пастилки содержат изомальтит (тип M) (E953) и бутилгидроксианизол (E320)

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, сообщите об этом врачу или работнику аптеки прежде, чем принимать препарат.

Бутилгидроксианизол (E320) может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® ПЛЮЩ ПАСТИЛКИ

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Если у вас имеются сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.
Обычная доза для взрослых, людей пожилого возраста и подростков в возрасте от 12 лет и старше: 1 пастилка три раза в день.

15.02.2022	СОГЛАСОВАНО	на документах
	МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	стр 2 из 5
	РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
	Приказ Министерства здравоохранения	
	Республики Беларусь	

Применение у детей

Обычная доза для детей в возрасте от 6 до 11 лет: 1 пастилка два раза в день.

Пастилки рассасывают в полости рта до полного растворения.

Во время лечения рекомендуется обильное питье. Гербион® плющ пастилки не должны приниматься непосредственно перед или во время приема пищи.

Если симптомы сохраняются более одной недели после начала приема препарата, следует проконсультироваться с врачом или работником аптеки. Необходимость продолжения лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата.

Если вы приняли препарата Гербион® плющ пастилки больше, чем следовало

Не превышайте рекомендуемую дозу. Прием доз, превышающих рекомендованные (превышающие суточную дозу более, чем в два раза), может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение. Лечение симптоматическое.

Если вы забыли принять препарат Гербион® плющ пастилки

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению данного препарата, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота неизвестна (частота не может быть определена на основании имеющихся данных):


- тошнота, рвота, диарея;
- аллергическая реакция, сопровождающаяся крапивницей, сыпью и затруднением дыхания (одышкой);
- тяжелая аллергическая реакция (анафилактическая реакция), которая может проявляться в виде отека слизистой полости рта, языка, лица и/или горла, затруднения дыхания или глотания (чувство сдавленности в груди или одышка).

При появлении аллергической реакции прекратите прием препарата и проконсультируйтесь с врачом. В случае сильной аллергической реакции обратитесь за неотложной медицинской помощью.


В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе тех, которые не перечислены в данном листке-вкладыше, вам следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.



15.02.2022



Л.Д.ОН. стр. 3 из 5

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® ПЛЮЩ ПАСТИЛКИ

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от влаги.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в водопровод или канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не требуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Гербион® плющ пастилки содержит

Действующие вещества

Каждая пастилка содержит 35 мг сухого экстракта листьев плюща (*Hedera helix L.*, Araliaceae, folium) (5 – 7,5 : 1)

Экстрагент: этанол 30% (м/м)

Вспомогательные вещества: изомальтит (Тип М) (E953), лимонная кислота (E330), сукралоза (E955), вкусоароматическая добавка Карамель (состоит из вкусоароматических продуктов и натуральных вкусоароматических веществ, пропиленгликоля (E1520) и воды), вкусоароматическая добавка Цитрус (состоит из вкусоароматических продуктов и натуральных вкусоароматических веществ, лимонных терпенов, масла лимона холодного прессования, бутилгидроксианизола (E320)), масло мяты перечной.

См. раздел 2 «Гербион® плющ пастилки содержат изомальтит (тип М) (E953) и бутилгидроксианизол (E320)»

Внешний вид препарата Гербион® плющ пастилки и содержимое упаковки


Пастилки.

Круглые пастилки со скошенными краями и шероховатой поверхностью от светло-коричневого до коричневого цвета. Допускаются небольшие пятна, пузырьки воздуха и слегка сколотые края, а также присутствие частиц от желтого до коричневого цвета.

8 пастилок в блистере ((ПВХ/ПЭ/ПВДХ)/алюминиевая фольга). 2 или 4 блистера с листком-вкладышем в картонной коробке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.



Держатель регистрационного удостоверения и производитель
 KRKA d.d., Ново место, Шмарешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Представитель держателя регистрационного удостоверения в Республике Беларусь
 Представительство Акционерного Общества «KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D., D., NOVO MESTO» (Республика Словения) в Республике Беларусь: ул. Филимонова 25Г,

9452 - 2020

офис 315, 220114, г. Минск, Республика Беларусь, Тел/факс: +375 740 740 9230, E-mail: info.by@krka.biz.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

15.02.2022

стр.5 из 5

