

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**  
**КЛИМАЛАНИН**

**Торговое название:** КЛИМАЛАНИН

**Международное непатентованное название:** —

**Лекарственная форма:** таблетки.

**Состав на 1 таблетку**

*Действующее вещество:*

Бета-аланин 400,0 мг.

*Вспомогательные вещества:*

Магния стеарат (Е470), глицерина пальмитил стеарат, кремния диоксид коллоидный гидратированный, крахмал пшеничный.

**Описание**

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого цвета с блестящими сероватыми краплениями. Допустима незначительная шероховатость поверхности.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие средства для применения в гинекологии.

**Код АТХ:** G02CX

**Фармакологические свойства**

Бета-аланин – аминокислота, которая оказывает воздействие на кожную периферическую вазодилатацию, являясь негормональным ингибитором приливов в период менопаузы.

**Показания к применению**

«Приливы» в период менопаузы.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Повышенная чувствительность или непереносимость глютена (в связи с наличием в составе препарата пшеничного крахмала).

**Способ применения и дозировка**


Препарат принимают внутрь по 1-2 таблетки ежедневно. При необходимости доза может быть увеличена до 3 таблеток в сутки. Длительность лечения составляет от 5-10 дней до исчезновения "приливов".


При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения.

Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.

**Меры предосторожности**

В случае наличия почечной или печеночной недостаточности рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом. Следует с осторожностью применять данное лекарственное средство.



**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

**Применение в период беременности и грудного вскармливания**

Препарат Клималанин предназначен для использования у женщин в период менопаузы.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

**Побочное действие**

Редко: проходящие парестезии, как правило, в верхних и нижних конечностях.

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь).

**Упаковка**

15 таблеток в блистере из ПВХ/алюминия. По 2 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Лаборатории БУШАРА-РЕКОРДАТИ, Франция