



Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ
URTICAE FOLIA

Регистрационный номер _____

Форма выпуска

Измельченное сырье

Общая характеристика

Кусочки листьев различной формы, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Кусочки листовых пластинок тонкие, ломкие, шершавоволосистые; особенно много волосков по жилкам листа. Кусочки черешков в сечении округлые или полуокруглые с бороздкой на верхней стороне черешка, покрытые волосками. Цвет от зеленого до темно-зеленого с возможным присутствием серо-зеленых, белых, желтовато-белых и коричневых вкраплений. Запах слабый.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие диуретики.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное и диуретическое действие, повышает тонус матки.

Показания к применению

Внутрь: в качестве мочегонного средства в комплексной терапии легких воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелых болей в суставах.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, заболевания почек или тяжелые заболевания сердца). Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Применение лекарственного средства не рекомендовано пациентам с повышенной свертываемостью крови, кровотечениях.

Способ применения и дозы

5 г (2 столовые ложки) листьев заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь: по 1/4-1/2 стакана 3-5 раз в день до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница), желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Если боли в суставах сопровождаются отеком суставов, покраснением кожи или повышением температуры, необходимо обратиться к врачу.

Если во время приема лекарственного средства возникают такие симптомы, как повышение температуры, расстройства мочеиспускания, боли спастического характера или появляется кровь в моче, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение при беременности и лактации. В связи с отсутствием данных не рекомендуется применять во время беременности и лактации.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования не проводились.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь