


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ



**ГЛЮКОЗА,**

порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 15 г

**Общая характеристика.**

**Международное и химическое название.** Glucose.

**Описание.** Белый кристаллический порошок, без запаха.

**Состав.** Каждый пакет содержит: глюкоза моногидрат – 15,00 г; вспомогательные вещества: лимонная кислота моногидрат.

**Лекарственная форма.** Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения.

**Фармакотерапевтическая группа.** Диагностические препараты. Тесты для выявления диабета. Декстроза. Код АТХ: V04CA02.

**Показания к применению.** Пероральный глюкозо-толерантный тест необходимо применять в случае, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или диабета.

**Способ применения и дозы.** Пациент не должен уменьшать количество еды в течение 3 дней до проведения теста. Непосредственно перед проведением теста пациент не должен принимать пищу в течение 10-16 часов. Тест проводится утром. Сначала определяется уровень глюкозы в крови натощак. После этого в течение 5 мин надо выпить 75 г (5 пакетов по 15 г) глюкозы, растворенной в одном стакане (250 мл) воды. При проведении пробы у лиц с избыточным весом, глюкозу добавляют из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г. Через 2 часа определяется уровень глюкозы в крови.

**Дети.** После первого взятия крови из пальца обследуемый ребенок принимает водный раствор глюкозы в течение 5 мин из расчета – 1,75 г на 1 кг массы тела, но не более 75 г.

**Побочное действие.** Не зарегистрировано.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к глюкозе.

**Передозировка.** При однократном применении большого количества препарата возможно нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, понос). Рекомендуется симптоматическая терапия.

**Меры предосторожности.** Во время проведения теста пациент должен спокойно лежать или сидеть, непосредственно перед проведением теста не следует курить, переохлаждаться и заниматься физической работой.

Тест не рекомендуется проводить после истощающих заболеваний, операций и родов, при воспалительных процессах, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях ЖКТ с нарушением всасывания глюкозы.

Перед проведением теста необходимо исключить прием лекарств (адреналина, глюкокортикоидов, контрацептивов, кофеина, мочегонных средств тиазидного ряда,

психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови.

Ложноположительные результаты наблюдаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.

*Применение в период беременности и кормления грудью.* Не противопоказано.

*Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.* Не влияет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не выявлено.

**Условия хранения и срок годности.** В защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 15,15 г порошка в пакетах, по 5 пакетов в пачке.

**Информация о производителе.**

ОАО «Экзон»,

225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

