


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

ДЕТРАВЕН®

Перед приемом этого лекарства внимательно прочитайте весь листок-вкладыш:

- *Не выбрасывайте этот листок. Возможно, возникнет необходимость перечитать его.*

- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к своему врачу, провизору или фармацевту.*

- *Это лекарство должно быть Вам выписано врачом. Не передавайте его другим. Это может нанести им вред, даже, если их симптомы такие же, как Ваши.*

Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или, если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите об этом врачу или фармацевту

Торговое название: Детравен®.

Форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг.

Описание: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, розового цвета, овальные, с двояковыпуклой поверхностью.

Состав: одна таблетка содержит: *действующие вещества:* смесь диосмина-гесперидина (90:10) в пересчете на общее содержание флавоноидов – 500 мг; *вспомогательные вещества:* желатин, тальк, магния стеарат, натрия крахмал гликолят, целлюлоза микрокристаллическая, опадрай 200 F (спирт поливинило-

вый, частично гидролизированный; титана диоксид E 171; тальк; макрогол 3350 (полиэтиленгликоль); сополимер метакриловой кислоты тип C; железа оксид желтый E 172; железа оксид красный E 172; натрия бикарбонат E 500ii; железа оксид черный E 172).

Фармакотерапевтическая группа: средства, снижающие проницаемость капилляров. Биофлавоноиды.

Код АТХ: C05CA53

Показания к применению

- Лечение (в составе комплексной терапии) симптомов венозно-лимфатической недостаточности (тяжесть, отечность и боль в ногах, трофические нарушения).

- Лечение (в составе комплексной терапии) симптомов, связанных с острым приступом геморроя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ.

Способ применения и дозы

Лечение симптомов венозной недостаточности: по 2 таблетки в день (в полдень и вечером) во время еды.


Острый геморрой:

Первые 4 дня: 6 таблеток в сутки (3 таблетки утром и 3 таблетки вечером).

Следующие 3 дня: 4 таблетки в сутки (2 таблетки утром и 2 таблетки вечером). Применять во время еды.

Побочное действие

Были получены сообщения о следующих побочных эффектах или явлениях, частота указана в зависимости от встречаемости случая: очень часто ($>1/10$), часто ($<1/10$ и $\geq 1/100$), нечасто ($<1/100$ и $\geq 1/1000$), редко ($<1/1000$ и $\geq 1/10000$), очень редко ($<1/10000$), частота неизвестна (невозможно провести оценку на основании имеющихся данных).



Со стороны нервной системы: редко - головное головокружение, головная боль, общее недомогание.

Со стороны пищеварительной системы: часто - диарея, тошнота, рвота, диспепсия; нечасто - колит.

Нарушения со стороны кожных покровов и подкожной ткани: редко - сыпь, зуд, крапивница; частота неизвестна - изолированный отек лица, губ, век; в исключительных случаях - ангионевротический отек.

Меры предосторожности

При острых приступах геморроя прием данного лекарственного средства не заменяет специального лечения других заболеваний аноректальной области. Лечение должно назначаться коротким курсом. Если симптомы не проходят быстро, необходимо провести проктологическое обследование и пересмотреть лечение.

При расстройствах, влияющих на венозное кровообращение, лечение производит максимальный эффект при сбалансированном образе жизни. Избегайте длительного пребывания на солнце, длительного стояния на ногах, увеличения веса тела. Пешие прогулки улучшают кровообращение. Пациентам следует неукоснительно соблюдать назначенные врачом дополнительные лечебные меры, такие как ношение компрессионного лечебного трикотажа (гольфы, чулки), компрессы, прохладный душ на область нижних конечностей и т.д.

Применение у детей

Не применять у детей.

Применение в период беременности или кормления грудью. В ходе многочисленных исследований тератогенного эффекта обнаружено не было и сообщений о нежелательных явлениях у человека не поступало.

Ввиду отсутствия данных об экскреции препарата в грудное молоко, кормления грудью во время лечения следует избегать.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Лекарственное средство не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работы, требующей высокой скорости психомоторных реакций.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерство Здравоохранения
Республики Беларусь

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследований взаимодействия не проводилось. В то же время, принимая во внимание огромный пост-маркетинговый опыт с аналогичными лекарственными средствами, о лекарственных взаимодействиях не сообщалось.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Упаковка

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 3 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток с листком-вкладышем в пачке из картона (№10×3, №10×6).

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь. Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375 (177)735612, 731156.