


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента) по медицинскому применению лекарственного средства **ЦИНКОВАЯ МАЗЬ**

*Перед применением данного лекарственного средства полностью прочтайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.*

*Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется про читать его еще раз.*

*Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре.*

*Это лекарственное средство назначено именно Вам. Не передавайте его другим. Оно может навредить этим людям, даже, если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.*

*Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе «Побочное действие» листка-вкладыша.*

**Торговое название:** Цинковая мазь.

**Международное непатентованное название:** -

**Форма выпуска:** мазь для наружного применения 100 мг/г.

**Описание:** мазь белого или светло-желтого цвета.

**Состав:** одна туба (25 г) содержит: действующего вещества – цинка оксида – 2,5 г; вспомогательные вещества: парафин мягкий белый.

**Фармакотерапевтическая группа:** смягчающие и защитные средства.

Средства на основе цинка.

Код ATX: D02AB.

## **Показания к применению**

- лечение и профилактика пеленочного дерматита;
- лечение дерматитов, экземы, опрелостей;
- лечение повреждений кожи (небольшие термические и солнечные ожоги, порезы, царапины).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам мази. Гнойно-воспалительные заболевания кожи и прилегающих тканей.

## **Способ применения и дозы**

### *Пеленочный дерматит у детей*

С целью профилактики мазь наносят на чистую и сухую кожу (под пеленки), особенно перед сном для предотвращения возникновения раздражения кожи из-за длительного контакта с мокрыми пеленками.

С лечебной целью мазь наносят на кожу тонким слоем 2-3 раза в сутки (при необходимости – во время каждой смены пеленок) при появлении первых признаков гиперемии (покраснения кожи), опрелости или незначительного раздражения кожи.

*Дерматиты, экзема, термические и солнечные ожоги, порезы, царапины, опрелости.*

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки 3 - 4 раза в сутки.

Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

## **Меры предосторожности**

Мазь предназначена только для наружного применения. Не применять при гнойничковых заболеваниях кожи.

Мазь наносить только на неинфицированные участки кожи.

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. В случае попадания мази в глаза следует промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Если пеленочный дерматит у ребенка не исчезает в течение 7 дней от на-

чала применения лекарственного средства, необходимо прекратить лечение и обратиться за повторной консультацией к врачу.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

### **Побочное действие**

Реакции повышенной чувствительности к лекарственному средству, включая зуд, гиперемию, сыпь, изменения в месте нанесения мази, шелушение, боль, крапивницу. При длительном применении возможно раздражение кожи. При развитии побочных реакций рекомендуется прекратить применение мази.

### Сообщение о предполагаемых побочных реакциях

*Если у Вас появились какие-либо симптомы, описанные или не описанные в данном листке-вкладыше, обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу!*

### **Применение в период беременности и лактации**

Применение мази в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### *Дети*

Лекарственное средство можно применять в педиатрической практике.

### **Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами**

Лекарственное средство не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не отмечено лекарственного взаимодействия Цинковой мази с лекарственными средствами системного действия. Данные о взаимодействии цинковой мази с другими топическими средствами отсутствуют; поэтому их одновременное применение не рекомендуется.

### **Передозировка**

При местном применении передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь в больших дозах могут возникать боли в желудке, тошнота, рвота, диарея, стимуляция центральной нервной системы и судороги. Лечение

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

симптоматическое.

### **Упаковка**

По 25 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

5 лет. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.