

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

ЗВЕРОБОЯ ТРАВА
HYPERICI HERBA

Регистрационный номер: _____

Форма выпуска

Порошок крупный.

Общая характеристика

Смесь кусочков стеблей, листьев, цветков и бутонов, незрелых плодов и их частей, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 2 000 мкм. Цвет от желтовато-зелёного до коричневатого-зелёного с многочисленными белыми, желтовато-белыми, жёлтыми и коричневыми вкраплениями. Запах слабый, своеобразный.

Трава зверобоя содержит дубильные вещества, флавоноиды (гиперозид, рутин), диантроны (гиперицин, псевдогиперицин и др.), каротиноиды, аскорбиновую кислоту, эфирное масло, смолистые вещества и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным и антибактериальным действием.

Показания к применению

Внутрь: симптоматическое лечение легкого дискомфорта в области желудочно-кишечного тракта.

Местно: в комплексном лечении воспалительных заболеваний полости рта.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к биологически активным веществам препарата, а также к растениям семейства Клузиевых; артериальная гипертензия; при применении внутрь – беременность, период лактации; детский возраст до 12 лет; фотодерматит (в т.ч. в анамнезе). Одновременное применение с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), препаратами, снижающими кислотность желудка, антибиотиками.

Способ применения и дозы


1 фильтр-пакет помещают в эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, закрывают крышечкой и настаивают 15 мин.

Фильтр-пакет отжимают.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана (100 мл) водного извлечения 3 раза в день за 30 мин до еды.

Местно используют для полоскания полости рта 1/2 стакана водного извлечения 3-4 раза в день.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение использовать свежеприготовленным.



Продолжительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие

Аллергические реакции: зуд кожи, кожная сыпь, экзема, пигментация кожи, лекарственное средство оказывает фотосенсибилизирующее действие (повышает чувствительность кожи к действию солнечного света).

Со стороны центральной нервной системы: беспокойство, повышенная утомляемость, головная боль.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в эпигастрии, сухость во рту, боль в животе, метеоризм, диарея или запор, анорексия. При длительном применении может вызвать неприятные ощущения в области печени и чувство горечи во рту.

Со стороны органов кроветворения: железодефицитная анемия.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Во время лечения следует избегать действия ультрафиолетовых лучей (посещение солярия, длительное пребывание на солнце) из-за возможного развития фотосенсибилизации, особенно у лиц со светлой кожей.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение в период беременности и лактации

В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работы с другими механизмами

Если во время лечения возникают побочные реакции со стороны центральной нервной системы (головокружение, утомляемость), следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.

Применение у детей

Применение у детей до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных. Прием внутрь детям старше 12 лет возможен только по назначению врача.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует. После приема чрезмерной дозы могут появляться симптомы фототоксичности на коже и усиливаться побочные реакции. В течение 1-2 недель после приема внутрь большой дозы кожу необходимо защищать от солнечного света и ультрафиолетового облучения (ограничить длительность прогулок, защищать кожу одеждой и солнцезащитными кремами с высоким фактором защиты).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется применение зверобоя травы с антидепрессантами. Следует избегать одновременного применения с бета-симпатомиметиками. Дубильные вещества, присутствующие в зверобое могут препятствовать всасыванию железа. Следует избегать одновременного использования с другими фотосенсибилизаторами, такими как: тетрациклин, сульфаниламиды, тиазиды, хинолоны, пироксикам и другие. Зверобой повышает активность цитохрома CYP3A4 системы P450. Зверобой может существенно влиять на плазменные концентрации любого препарата, который метаболизируется системой цитохрома P450, например, таких как: дигоксин (возможно уменьшение эффективности дигоксина, а после прекращения приема препаратов зверобоя – усиление токсичности дигоксина); теофиллин (зверобой уменьшает концентрацию теофиллина в плазме крови у пациентов, регулярно получающих теофиллин); пероральные контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол и левоноргестрел (имеются сообщения о развитии ациклического кровотечения при одновременном применении зверобоя с пероральными контрацептивами, содержащими комбинацию


этинилэстрадиола и левоноргестрела); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (возможно усиление эффектов и развитие серотонинового синдрома (повышенное потоотделение, тремор, покраснение, спутанность сознания, ажитация); ингибиторы МАО (возможно усиление эффектов и развитие гипертонического криза); циклоспорин (возможно уменьшение концентрации циклоспорина в плазме крови). Противопоказан одновременный прием циклоспорина, такролимуса для системного применения, ампренавира, индинавира и других ингибиторов протеаз, иринотекана и варфарина.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.



Условия хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С.

Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 1,2 г в фильтр-пакетах в пачке картонной №20. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.