

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от « 07.07.2022 № 906

ЛИСТОК - В КЛАДЫШ (информация для потребителей) по медицинскому применению лекарственного средства

Хлорофиллит-Ферейн

Название лекарственного средства. Хлорофиллит-Ферейн.

Форма выпуска. Таблетки для рассасывания.

Общая характеристика. Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской от светло-зеленого до зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями с характерным запахом. Риска не предназначена для деления таблетки на дозы и не несет на себе функциональной нагрузки.

Состав на одну таблетку.

Действующее вещество: хлорофиллита экстракт густой (евкалипта листьев экстракт (DER: 10-14:1), экстрагент – 95 % этиловый спирт) в пересчете на сухое вещество с антибактериальной активностью в концентрации 12,5 мкг в 1 мл среды – 25,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза – 617,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 120,0 мг, лимонной кислоты моногидрат – 30,0 мг, кальция стеарат – 8,0 мг.

Фармакотерапевтическая группа. Антиинфекционные и антисептические средства для местного орального применения.

Фармакологические свойства.

Препарат обладает антибактериальным действием, оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению.

В комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит).

Способ применения и дозировка.

Местно. По 1 таблетке 5 раз в день через 30-40 мин после еды. Максимальная суточная доза – 5 таблеток. Таблетки следует рассасывать во рту до полного растворения, не разжевывая. Длительность лечения 7 дней.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции, местнораздражающее действие на слизистую оболочку полости рта.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахарозы/изомальтазы, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Передозировка.

Случаев передозировки хлорофиллипта при местном применении до настоящего времени не зарегистрировано.

Меры предосторожности.

Перед началом лечения необходимо сделать тест на чувствительность пациента к лекарственному препарату. При отсутствии через 6-8 часов аллергических реакций после приема одной таблетки, можно начинать курсовое лечение.

Во избежание местнораздражающего действия препарата на слизистую оболочку полости рта не следует держать таблетку под языком или за щекой, а рекомендуется активно рассасывать ее в полости рта (не более 30 минут).

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится 0,617 г углеводов (0,051 ХЕ).

Применение в период беременности или в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами и на выполнение других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Условия хранения и срок годности.

Хранить при температуре ниже 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Срок годности – 2 года.

Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной, по 2 упаковки с листком-вкладышем в пачку из картона.

Информация о производителе.

Произведено и расфасовано:

ЗАО «ВИФИТЕХ», Российская Федерация,
тел./факс: +7 495 716-15-81, +7 495 716-15-90

Упаковано:

СОАО «Ферайн», Республика Беларусь,
220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А,
тел./факс: +375 17 394-92-18, тел.: +375 17 222-97-73, +375 17 213-12-58,
e-mail: office@ferane.by