


0219Б-2018



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
РЕПАРЭФ-1,**

мазь для наружного и местного применения

Действующее вещество: этиловые эфиры жирных кислот (в виде биена) и диоксидин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат РЕПАРЭФ-1 и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата РЕПАРЭФ-1
3. Применение препарата РЕПАРЭФ-1
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата РЕПАРЭФ-1
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат РЕПАРЭФ-1
и для чего его применяют**

Препарат РЕПАРЭФ-1, мазь для наружного и местного применения, содержит действующее вещество биен – комплекс этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот и диоксидин – антибактериальный бактерицидный препарат широкого спектра действия. Репарэф-1 — ранозаживляющий и противоожоговый препарат, обладает регенерантными и репаратными свойствами.

РЕПАРЭФ-1 применяется у взрослых при лечении:

- гнойных ран;
- ожогов различной этиологии и локализации;
- пролежней;
- трофических язв;
- эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки рта (простой герпес губы (рецидивирующий));
- герпетического гингивостоматита на этапе пролиферации;
- рецидивирующих афт полости рта;
- эритемы многоформной (проявления в полости рта).

**2. О чем следует знать перед применением
препарата РЕПАРЭФ-1**

Не применяйте РЕПАРЭФ-1, если у вас:

- аллергия на биен, диоксидин или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);



- злокачественные и доброкачественные новообразования кожи и слизистой оболочки полости рта;
- надпочечниковая недостаточность (в том числе в анамнезе).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата РЕПАРЭФ-1 проконсультируйтесь с лечащим врачом или с работником аптеки.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

При хронической почечной недостаточности дозу уменьшают. Диоксидин назначают только при неэффективности других противомикробных лекарственных препаратов.

Следует избегать попадания мази в глаза (в случае попадания промыть глаза теплой водой).

При ухудшении течения заболевания или появлении новых симптомов, возникших при лечении мазью РЕПАРЭФ-1, обратитесь к врачу.

Дети и подростки

Не применяйте препарат РЕПАРЭФ-1 у детей и подростков (в возрасте до 18 лет), поскольку безопасность и эффективность для них на данный момент не установлены.

Другие препараты и препарат РЕПАРЭФ-1

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без назначения.

Не отмечено лекарственного взаимодействия мази РЕПАРЭФ-1 с лекарственными препаратами системного действия. Данные о взаимодействии мази РЕПАРЭФ-1 с другими препаратами, применяемыми местно, отсутствуют; поэтому их одновременное применение не рекомендуется.

Препарат РЕПАРЭФ-1 с пищей и напитками

При лечении эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта прием пищи и напитков рекомендуется не ранее чем через 1-1,5 часа после аппликации мази на пораженные участки.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Противопоказано применение препарата РЕПАРЭФ-1 во время беременности и в период кормления грудью, в настоящее время отсутствуют адекватные клинические данные о безопасности применения препарата во время беременности и в период лактации.


Вождение автотранспорта и управление механизмами

Не влияет на способность к управлению транспортными средствами и выполнение других работ, требующих повышенной концентрации внимания.

3. Применение препарата РЕПАРЭФ-1

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Для наружного и местного применения у взрослых.



Мазь применяют 1 раз в сутки (для всех показаний).

Длительность применения мази РЕПАРЭФ-1 для лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта не должна превышать 7 дней.

Мазь РЕПАРЭФ-1 наносят тонким слоем на поверхность раны, язвы или ожога после их первичной хирургической обработки и (или) промывания антисептиками. Сверху накладывают стерильную марлевую повязку, пропитанную мазью с внутренней стороны. В зависимости от состояния и площади ран аппликацию повторяют 1-2 раза в сутки в течение 4-5 дней.

Для лечения эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки рта мазь РЕПАРЭФ-1 применяют местно в виде аппликаций (на ватных или марлевых пластинках) на эрозивные и язвенные поверхности слизистой оболочки рта до завершения эпителизации (не более 7 дней). Длительность аппликации 5-7 минут.

Если симптомы сохраняются более 7 дней, следует обратиться к врачу для решения вопроса о продолжении терапии.

Если вы считаете, что действие лекарственного препарата слишком слабое или слишком сильное, проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы по применению мази РЕПАРЭФ-1, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, РЕПАРЭФ-1 может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат хорошо переносится пациентами. В отдельных случаях после начала лечения мазью РЕПАРЭФ-1 возможно преходящее ощущение легкого жжения, зуд в месте аппликации. Редко – при длительном применении развитие околораневого дерматита.

При появлении нежелательных реакций следует прекратить применение мази и обратиться к врачу. Решение о возобновлении лечения мазью принимает врач с учетом соотношения «польза-риск» для каждого пациента.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата РЕПАРЭФ-1

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 г мази содержит *действующее вещество*: этиловых эфиров жирных кислот суммарно (в виде биена) – 80 мг, диоксидина – 5 мг; *вспомогательные вещества*: масло эфирное герани, полисорбат 80, макрогол 1500, макрогол 400.

НД РБ

0219Б-2018



Внешний вид препарата РЕПАРЭФ-1 и содержимое упаковки
Мазь от желтого до коричневого цвета со слабым специфическим запахом.
По 15 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: