


**по медицинскому применению
(листок-вкладыш)****КАМЕТОН, аэрозоль для местного применения**

Действующие вещества: хлорбутанол гемигидрат, камфора рацемическая, левоментол, эвкалиптовое масло

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

В этом листке-вкладыше содержится следующая информация:

1. Что из себя представляет препарат Каметон и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Каметон.
3. Применение препарата Каметон.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Каметон.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Каметон и для чего его применяют.

Лекарственный препарат Каметон содержит действующие вещества: хлорбутанол гемигидрат, камфора рацемическая, левоментол, эвкалиптовое масло.

Каметон относится к группе антисептических средств для лечения заболеваний гортани и глотки.

Препарат Каметон применяется для местного лечения острых и хронических (преимущественно в стадии обострения) инфекционно-воспалительных заболеваний горла и носа: тонзиллита, фарингита, ларингита, ринита.

Лекарственный препарат показан к применению взрослым и детям с 5 лет.


Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Каметон.

Не применяйте лекарственный препарат Каметон:

- если у Вас аллергия на действующие вещества (хлорбутанол гемигидрат, камфора рацемическая, эвкалиптовое масло или левоментол) и/или на какие-либо другие ингредиенты этого лекарства, упомянутые в разделе б;

- в детском возрасте до 5 лет.



Особые указания и меры предосторожности.

Не распыляйте препарат вблизи огня, оберегайте от ударов. Не разбирайте и не давайте детям баллон с препаратом. После применения препарата наденьте на распылитель защитный колпачок, чтобы предотвратить его загрязнение. Флакон должен использоваться только одним лицом из-за риска передачи инфекции. При впрыскивании в нос не запрокидывайте голову и не переворачивайте баллон. Во время распыления препарата избегайте его попадания в глаза.

Если Вы склонны к аллергии, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Соблюдайте осторожность при применении Каметон в случае наличия в анамнезе воспалительных заболеваний или изъязвлений желудочно-кишечного тракта. Если у Вас диагностирована бронхиальная астма или респираторное заболевание, сопровождающееся гиперактивностью дыхательных путей, Вам следует применять препарат с осторожностью из-за риска бронхоспазма.

Если у Вас в анамнезе имеются судороги, перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом, так как лекарственный препарат содержит в составе производные терпенов, которые могут понизить порог судорожной готовности.

Если во время применения лекарственного препарата симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, обязательно обратитесь к лечащему врачу.

Дети.

Если Ваш ребенок старше 5 лет, лекарственный препарат Каметон применяют с осторожностью из-за риска развития бронхоспазма и только по назначению врача. Вы можете применять данный препарат Вашему ребенку при условии, что он не сопротивляется введению постороннего предмета (распылителя) и способен контролировать дыхание при распылении.

Данный препарат не следует применять, если у Вашего ребенка судороги в анамнезе (в том числе фебрильные).

Другие препараты и препарат Каметон.

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь использовать какие-либо другие лекарства, в частности снижающие порог судорожной активности.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность.

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

В связи с отсутствием данных по безопасности, использовать лекарственный препарат в период беременности и лактации не рекомендуется.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами.

Принимая во внимание профиль нежелательных реакций, не ожидается, что Каметон повлияет на управление транспортом или работу с механизмами.

3. Применение препарата Каметон.

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача или работника аптеки.

В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Режим дозирования.**Взрослые.**

При лечении ринита за одно применение произведите по 2-3 распыления в каждую ноздрю. Частота применения - 3-4 раза в сутки.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (тонзиллит, фарингит, ларингит) за одно применение произведите по 2-3 распыления. Частота применения - 3-4 раза в сутки.

Продолжительность лечения непрерывно обычно составляет 6-7 суток (длительность терапии врач определит индивидуально). Лекарственный препарат не применяйте дольше 1 недели.

Дети.

Не применяйте лекарственный препарат у детей младше 5 лет.

При лечении ринита за одно применение у детей старше 15 лет произведите по 2-3 распыления в каждую ноздрю, у детей от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления, у детей в возрасте от 5 до 12 лет - по 1 распылению. Частота применения - 3-4 раза в сутки.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (тонзиллит, фарингит, ларингит) за одно применение у детей старше 15 лет произведите по 2-3 распыления, у детей от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления, у детей в возрасте от 5 до 12 лет - по 1 распылению. Частота применения - 3-4 раза в сутки.

Продолжительность лечения непрерывно обычно составляет 6-7 суток (длительность терапии врач определит индивидуально). Лекарственный препарат не применяйте дольше 1 недели.

Способ применения.

При лечении ринита предварительно очистите нос от слизи. Распыление лекарственного препарата проведите на фазе вдоха.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (тонзиллит, фарингит, ларингит) применяйте лекарственный препарат после еды. Перед применением прополощите ротовую полость теплой кипяченой водой. После распыления препарата в полости рта, некоторое время (5-10 минут) воздержитесь от приема пищи и воды для обеспечения максимального воздействия.

Для применения препарата снимите с распылителя защитный колпачок, затем введите распылитель в полость носа на глубину 0,5 см или рта, затем нажмите на основание распылителя до упора. Содержимое баллона при этом распыляется в мелкодисперсном состоянии. За 1 нажатие распыляется 0,1 г лекарственного препарата, в котором содержится суммарно 1,33 мг действующих веществ.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы применили препарата Каметон больше, чем следовало

Применение дозы препарата выше рекомендованной может вызвать усиление нежелательных реакций. Если Вы применили препарата Каметон больше, чем следовало обратитесь к врачу.

Лечение

Прекращение применения препарата, симптоматическая терапия.

Если Вы забыли применить препарат Каметон

Не используйте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную.

4. Возможные нежелательные реакции.

Подобно всем лекарственным препаратам Каметон может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая крапивницу, зуд, высыпания на коже, отек в месте контакта, у лиц с повышенной чувствительностью возможно развитие ангионевротического отека (отек Квинке).

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, ощущение сухости слизистой оболочки горла и носа.

Общие нарушения и реакции в месте введения: ощущение першения или жжения во рту.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций прекратите применение препарата и обязательно обратитесь к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях.

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов.

Республика Беларусь, 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <https://www.rceth.by>.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Каметон.

Не применяйте препарат после истечения срока годности.

Срок годности: 2 года.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Состав

Один баллон содержит:

действующие вещества: хлорбутанол гемигидрат - 0,1 г, камфора рацемическая - 0,1 г, левоментол - 0,1 г, эвкалиптовое масло - 0,1 г;

вспомогательные вещества: изопропилмиристат, хладон 134а.

Описание

Бесцветная или слегка желтоватого цвета прозрачная жидкость со специфическим запахом. Допускается опалесценция.

Форма выпуска и упаковка.


По 30 г в баллоны аэрозольные алюминиевые с клапанами дозирующего действия. Баллоны обеспечены защитным колпачком и распылителем для носа "РН-1" с защитным колпачком.

Каждый баллон с защитным колпачком, каждый распылитель с защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

На баллон наклеивают этикетку из самоклеящегося материала.

НД РБ

2502Б-2024



Условия отпуска из аптек.
Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Белалек», Республика Беларусь

222223, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»;

тел.: +375447777701

e-mail: info@belalek.by

Производитель

Произведено и расфасовано

АО «Стома», Украина

61105 г. Харьков, ул. Ньютона, 3.

Упаковано

ООО «Белалек», Республика Беларусь

222223, Минская область, Смолевичский район,

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»;

тел.: +375447777701

e-mail: info@belalek.by