

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
изделия медицинского назначения
ОЛИЗОЛ
спрей назальный

Состав на 1,0 мл:

Натрия гиалуронат – 1,9 мг, глицерин – 62,5 мг, полисорбат 80 – 1,9 мг, натрия бензоат – 5,0 мг, макроголиглицерина гидроксистеарат – 0,6 мг, лимонное масло – 0,6 мг, альфатокоферола ацетат – 0,1 мг, вода очищенная до 1,0 мл.

Описание:

Олизол, спрей назальный (далее - спрей) представляет собой прозрачную или опалесцирующую, бесцветную или с желтоватым оттенком жидкость.

Область применения:

Спрей предназначен для ухода за полостью носа.

Свойства:

Спрей увлажняет, устраняет симптоматические проявления сухости (раздражение, зуд, жжение), способствует заживлению и создает защитную пленку на слизистой оболочке носа за счет входящего в состав натрия гиалуроната. Гиалуроновая кислота является природным полимером, присутствует повсеместно в организме человека, обладает смазывающим, увлажняющим свойством и необходимой вязкостью, что способствует созданию защитной пленки в полости носа за счет своей высокой способности удерживать влагу, таким образом, обеспечивает равномерное длительное увлажнение слизистой носа и предохраняет слизистую оболочку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Также в состав спрея входит рацемический альфа-токоферола ацетат (Витамин Е), который за счет антиоксидантных свойств оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению:

Спрей может применяться у детей с 3 лет и взрослых:

- для создания защитной пленки и увлажнения слизистой оболочки носа;
- для удаления избыточных выделений и образовавшихся в носовой полости корок;
- для устранения симптоматических проявлений сухости (зуд, жжение, раздражение) слизистой оболочки полости носа, связанных с воздействием окружающей среды, сухого воздуха (кондиционирование, отопление) или послеоперационным заживлением;
- при повышенной кровоточивости слизистой оболочки полости носа;
- для ускорения регенерации после оперативных вмешательств;
- при изменении слизистой оболочки полости носа при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов.

Способ применения и дозы:

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 1-3 раза в сутки по мере необходимости. Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

Выполнение процедуры:

1. Снять с флакона защитный колпачок;
2. Несколько раз нажать на распылительную насадку до появления однородного спрея,



3. Распылить спрей поочередно в каждый носовой ход;
 4. При распылении флакон держать вертикально, не запрокидывать голову;
 5. После применения очистить кончик насадки флаcona салфеткой, закрыть защитным колпачком.

Флакон должен использоваться только одним пациентом.

Побочные действия:

Возможно развитие:

- аллергических реакций на компоненты спрея;
 - кратковременного жжения в месте введения.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам спрея.

Меры предосторожности:

Осмотрите флакон перед применением. Не используйте спрей, если флакон или насадка медицинского изделия повреждены.

Применение при беременности и лактации:

Спрей можно применять при беременности и кормлении грудью.

Взаимодействия с другими препаратами:

Сочетается со всеми препаратами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

Особые указания

Справки не относятся к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

Форма выпуска

Форма выпуска
По 10 мл во фляконе полистиленовом, укупоренном насадкой-распылителем с защитным колпачком в пачке картонной с инструкцией по применению.

Условия хранения

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

Срок:

Не применяйте спрей после истечения срока годности, указанного на упаковке.

После истечения срока годности, употреблять не рекомендуется.

Производитель:

Производитель:
ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел: +375 (212) 36-47-77,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by

