

6541 - 2017
Листок-вкладыш – информация для пациента**Папаверин, 20 мг, суппозитории ректальные**
Действующее вещество: папаверин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Папаверин, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Папаверин
3. Применение препарата Папаверин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Папаверин
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Папаверин, и для чего его применяют

Папаверин, входящий в состав препарата, является миотропным спазмолитическим средством, расслабляет гладкие мышцы внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, воздухоносных путей, мочеполовой системы) и сосудов.

Показания к применению

Спазм гладких мышц органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная колика).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Папаверин

Не применяйте препарат Папаверин:

- если у Вас аллергия на папаверин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- если у Вас атриовентрикулярная блокада,
- если у Вас глаукома,
- если у Вас тяжелая печеночная недостаточность,
- если у Вас угнетение дыхания,
- если у Вас коматозное состояние,
- у пациентов пожилого возраста (риск развития гипертермии),
- у детей в возрасте до 18 лет,
- если Вы беременны,
- если Вы кормите ребенка грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Папаверин проконсультируйтесь с лечащим врачом или

работником аптеки.

Препарат следует применять с осторожностью и в малых дозах при тяжелых заболеваниях сердца, хронической почечной недостаточности, недостаточности функции надпочечников, гипотиреозе, наджелудочковой тахикардии, шоковых состояниях, пациентам с черепно-мозговой травмой и состояниях после нее, при гиперплазии предстательной железы.

Эффективность препарата снижается при табакокурении.

В период лечения препаратом прием алкоголя должен быть исключен.

Дети и подростки

Не применяйте препарат у детей в возрасте до 18 лет.

Другие препараты и препарат Папаверин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, если Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Папаверин снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метилдопы.

Спазмолитическое действие папаверина усиливают дифенгидрамин (димедрол), метамизол (анальгин), диклофенак.

Гипотензивный эффект усиливается при совместном применении с антигипертензивными препаратами других групп.

При одновременном применении с сердечными гликозидами наблюдается выраженное усиление сократительной функции миокарда вследствие уменьшения общего периферического сопротивления сосудов.

При применении с новокаинамидом возможно усиление гипотензивного эффекта.

В комбинации с барбитуратами спазмолитическое действие папаверина усиливается.

Есть данные о развитии гепатита при совместном применении с фурадонином.

При комбинированном применении препаратов резерпина с папаверина гидрохлоридом антигипертензивное действие усиливается.

При сочетании с антидепрессантами возможно усиление гипотензивного эффекта.

Папаверина гидрохлорид потенцирует действие алкоголя.

У курящих пациентов метabolизм папаверина ускорен, а его концентрация в плазме крови и фармакологические эффекты уменьшаются.

Фармацевтически совместим с дибазолом.

Препарат Папаверин с алкоголем

Не принимайте алкоголь при лечении Папаверином.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не применяйте препарат Папаверин, если Вы беременны или кормите грудью ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Если во время лечения препаратом у Вас наблюдаются снижение артериального давления и сонливость, Вам следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с движущимися механизмами.

3. Применение препарата Папаверин

6541 - 2017

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

По 1 суппозиторию 2-3 раза в день после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы.

Путь и способ введения

Препарат применяют ректально. Освободив суппозиторий от контурной упаковки, его вводят в задний проход.

При использовании ректальных суппозиториев нередко возникает спазм в животе и позыв к дефекации, поэтому перед процедурой выполните очистительную клизму или опорожните кишечник естественным путем. Тщательно вымойте руки с мылом. Заранее приготовьте влажные салфетки или носовой платок, смоченный в воде.

Лягте на бок, прижав колени к животу. Для проведения процедуры эта поза наиболее удобна, так как позволяет свести к минимуму неприятные ощущения.

Извлеките свечу из упаковки. Свечу берут большим и средним пальцами правой руки в середине самой широкой части, указательный палец упирается в тупой конец свечи. Свечу направляют свободным концом к заднему проходу и проталкивают указательным пальцем в анальный канал до полного погружения на глубину 2-3 см. Проводите процедуру осторожно, не оказывая лишнего давления. Несмотря на то, что суппозиторий имеет обтекаемую форму, при неосторожном использовании можно травмировать слизистую оболочку.

Не вставайте с постели около 20 минут.

Протрите руки заранее приготовленной влажной салфеткой или носовым платком.

Если в течение 10 минут после введения ректальной свечи произошел позыв к дефекации, опорожните кишечник и введите новый суппозиторий. Если между введением суппозитория и дефекацией прошло больше 10 минут, дополнительная доза лекарства не требуется.

Если Вы применили препарата Папаверин больше, чем следовало

Если Вы применили больше суппозиториев Папаверин, чем следовало (передозировка), как можно скорее сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки.

Следующие симптомы могут указывать на передозировку препаратом Папаверин: нарушение зрения, дипlopия, слабость, сухость во рту, покраснение кожи верхней части туловища, гипервентиляция, нистагм, атаксия, тахикардия, асистолия, трепетание желудочеков, коллапс, артериальная гипотензия, сонливость, головная боль, тошнота, запор, повышенная потливость. При случайном применении очень больших доз папаверина возможно токсическое действие препарата в виде аритмий, полной или частичной атриовентрикулярной блокады.

В случае передозировки немедленно свяжитесь с врачом, работником аптеки или обратитесь в отделение экстренной помощи ближайшей больницы. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку, чтобы показать врачу, какой препарат Вы применяли.

При передозировке может потребоваться проведение симптоматической терапии, рекомендованной врачом.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции со стороны кожи: аллергические реакции, покраснение (гиперемия) кожи, крапивница, зуд, высыпания на коже, реакции в месте введения.

Нежелательные реакции со стороны крови: эозинофилия.

Нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы: атриовентрикулярная блокада, аритмия, фибрилляция желудочков, желудочковая экстрасистолия, тахикардия, асистолия, трепетание желудочков, коллапс, артериальная гипотензия.

Нежелательные реакции со стороны нервной системы: сонливость, слабость, головная боль, головокружение, апноэ.

Нежелательные реакции со стороны органа зрения: нарушение зрения (диплопия).

Нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта: повышение активности «печеночных» трансамина, тошнота, диарея, запор, анорексия, сухость во рту.

Прочие нежелательные реакции: повышенная потливость.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

www.rceth.by

5. Хранение препарата Папаверин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

При температуре не выше 25 °С. Хранить в потребительской упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке картонной) для защиты от света.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Папаверин содержит

Действующим веществом является папаверин.

Каждый суппозиторий содержит 20 мг папаверина гидрохлорида.

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является жир твердый (витепсол (марки Н 15, В 35), суппосир (марки НА 15, НАС 50)).

Внешний вид препарата Папаверин и содержимое упаковки

Суппозитории ректальные.

Суппозитории торпедообразной формы от белого до белого с желтоватым или коричневатым оттенком цвета. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек
Отпускают без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
АО «Нижфарм», Россия
ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105

Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:
АО «Нижфарм», Россия
ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105
Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Подробные сведения о данном препарате содержатся в Государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь <https://www.rceth.by/refbank>