



**Флоксал®, 3 мг/мл, капли глазные**  
**Офлоксацин (ofloxacin)**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими (не следует включать данное указание, если препарат предназначен только для стационарного применения).

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

#### СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Флоксал® и для чего его применяют.
2. Что следует знать перед применением препарата Флоксал®.
3. Применение препарата Флоксал®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Флоксал®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### 1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ФЛОКСАЛ® И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Флоксал® содержит действующее вещество офлоксацин, который является антибиотиком.

Препарат Флоксал® применяют для лечения инфекций переднего отдела глаза, вызванных чувствительными к офлоксацину возбудителями:

- хронический конъюнктивит;
- воспаление роговицы и язвы роговицы;
- хламидийные инфекции.

#### 2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ФЛОКСАЛ®

##### Не применяйте препарат Флоксал®:

-если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на офлоксацин и другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6.

##### Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Флоксал® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При использовании глазных капель Флоксал® следует учитывать следующее:

- у пациентов отмечался отек и разрыв сухожилий (которые могут проявляться скелетно-мышечной болью) во время пероральной или внутривенной терапии фторхинолонами, особенно у пациентов пожилого возраста и тех, кто одновременно лечился кортикостероидами. Прекратите использование глазных капель Флоксал®, если ваши сухожилия опухают или болят (тендинит), и обратитесь к врачу.
- Во время лечения глазными каплями Флоксал® не рекомендуется носить контактные линзы.
- По возможности следует избегать длительного принятия солнечных ванн или воздействия ультрафиолетового излучения (например, солнечных ламп, солярия и т. д.).

- Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с дефектом роговицы или язвой роговицы.
- Как и в случае с другими антибиотиками, при длительном применения глазных капель Флоксал® существует риск роста невосприимчивых микроорганизмов. Если такие инфекции возникнут во время лечения, ваш врач примет соответствующие меры.
- С осторожностью используйте глазные капли Флоксал®, если у вас повышенная чувствительность к другим хинолоновым антибиотикам.

#### **Дети и подростки**

Опыт применения глазных капель, содержащих офтальмацин, у детей ограничен. Поговорите со своим врачом, прежде чем применять этот лекарственный препарат для лечения инфекций глаз у детей.

#### **Другие препараты и препарат Флоксал®**

Сообщите лечащему врачу о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не известно.

#### **Беременность, грудное вскармливание и fertильность**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Нет сведений о вредном влиянии офтальмацина на плод, однако не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

После закапывания препарата в конъюнктивальный мешок глаза может наблюдаться временное (в течение нескольких минут) ухудшение остроты зрения (размытое изображение). Это необходимо учитывать при управлении транспортным средством и работе с механизмами.

#### **Препарат Флоксал® содержит бензалкония хлорид:**

Капли глазные Флоксал® содержат 0,00125 мг хлорида бензилкония в одной капле, что соответствует 0,025 мг/мл.

Бензилкония хлорид может впитываться в мягкие контактные линзы и вызывать изменение цвета контактных линз. Контактные линзы необходимо удалить перед применением препарата и вставить обратно только через 15 минут.

Бензилкония хлорид также может вызвать раздражение глаз, особенно если у вас сухость глаз или проблемы с роговицей (прозрачный слой в передней части глаза).

Проконсультируйтесь со своим врачом, если после использования капель во время применения лекарственного препарата возникает необычное ощущение, жжение или боль в глазу.

### **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛОКСАЛ®**

Всегда применяйте Флоксал® в точном соответствии с указаниями лечащего врача. Это поможет Вам получить лучшие результаты лечения и снизить риск развития побочных эффектов. Проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, если Вы не уверены.

#### **Рекомендуемая доза**

Применять по 1 капле 2-4 раза в день.

#### **Способ применения**

Для глазного использования.

При одновременном применении Флоксала® с другими глазными каплями/глазными мазями, необходимо соблюдать 15-минутный интервал, а капли глазные Флоксал® следует использовать последними.

Не рекомендуется использовать препарат более 2 недель.

#### **Если вы применили препарата Флоксал® больше, чем следовало**

Случай передозировки не известны. Если вы закапали слишком много капель, промойте глаз водой.

***Если вы забыли применить препарат Флоксал®***

Не используйте двойную дозу, если вы пропустили предыдущее применение. Просто примените препарат как можно быстрее, а затем вводите ту же дозу и с тем же интервалом/ритмом, как указано выше, или по назначению врача.

***Если вы прекратили применение препарата Флоксал®***

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарственного препарата, обратитесь к своему врачу.

**4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сообщалось о потенциально опасных для жизни кожных высыпаниях (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) при применении глазных капель Флоксал®. Первоначально они выглядели как красноватые, похожие на мишени точки или круглые пятна, часто с центральным вздутием на тулowiще. Возможны реакции гиперчувствительности в виде покраснения конъюнктивы и/или легкого жжения в обработанном глазу. Однако эти симптомы обычно делятся недолго.

С различной частотой могут возникать нежелательные реакции:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- раздражение глаз, дискомфорт в глазах.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- преципитаты роговицы, особенно в случае существовавших ранее заболеваний роговицы.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- реакции гиперчувствительности (включая ангионевротический отек, одышку, анафилактические реакции/анафилактический шок, рогоглоточный отёк и отек языка).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- кератит, конъюнктивит, нечеткое зрение, светобоязнь, отек глаз, ощущение инородного тела в глазах, усиленное слезотечение, сухость глаз, боль в глазах, покраснение конъюнктивы, гиперчувствительность (в том числе зуд глаз и век). Возможны реакции гиперчувствительности, такие как покраснение конъюнктивы и/или легкое жжение в глазу после лечения. Однако эти симптомы в основном временные;

- отек вокруг глаз (в том числе отек век), отек лица;

- тошнота;

- головокружение.

**Сообщения о предполагаемых нежелательных эффектах**


Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным в Республике Беларусь (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь, <http://www.rceh.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛОКСАЛ®**

Хранить в оригинальной упаковке, для того чтобы защитить от света. Не храните при температуре выше 25°C.

Не применяйте лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой окончания срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

**6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**



Что содержит Флоксал® 4869 - 2021

Действующим веществом лекарственного препарата является Офлоксацин.

В одном миллилитре Флоксала® содержится 3 мг действующего вещества Офлоксацина.  
Другие ингредиенты: бензалкония хлорид, натрия хлорид, хлористоводородная кислота 1M (в качестве корректора pH), натрия гидроксид 1M (в качестве корректора pH), вода для инъекций.

**Внешний вид Флоксала® и содержание его упаковки**

Прозрачный раствор светло-желтого цвета.

Первичная упаковка:

По 5 мл в полупрозрачном белом флаконе с капельницей из полиэтилена низкой плотности и белой крышкой из полиэтилена высокой плотности.

Вторичная упаковка:

1 флакон вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Держатель регистрационного удостоверения**

Россия, Москва

ООО «БАУШ ХЕЛС»

Ул. Шаболовка, 31 стр.5

Тел.: +7 (495) 510-2879

Факс: +7 (495) 510-2879

**Производитель**

Др. Герхард Манн,

хим-фарм предприятие ГмбХ,

Брюнсбюттер Дамм 165-173, 13581

Берлин, Германия

**За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:**

Республика Беларусь,

ООО «БАУШ ХЕЛС»

ул. Ольшевского, д. 22, оф. 22

Тел.: +375 17 397 44 22

Факс: +375 17 397 44 22

**Листок-вкладыш пересмотрен**

03/2024

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте <http://www.rceth.by>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте <http://www.rceth.by>.