

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

(листок-вкладыш)

ДЕПАНТОЛ®

- Внимательно прочтайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Торговое название препарата: Депантол®

Международное непатентованное название: отсутствует

Форма выпуска: суппозитории вагинальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

действующие вещества: декспантенол – 100 мг, хлоргексидина биглюконата раствор 20% - 85,2 мг (в пересчете на хлоргексидина биглюконат – 16 мг);

спомогательные вещества: смесь макроголов: макрогол 400 – 2 %, макрогол 1500 – 98 % – 2814,8 мг.

Описание

Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета. Допускается мраморность и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа


Прочие противомикробные и антисептические средства.

Код ATХ: G01AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Депантол® - комбинированный препарат для местного применения, оказывающий регенерирующее, антисептическое, метаболическое действие. Хлоргексидин, входящий в состав препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamidia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; дрожжи, простейшие (*Trichomonas vaginalis*). К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., а также



устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. Хлоргексидин умеренно активен в отношении микобактерий, дерматофитов и грибов. Декспантенол, входящий в состав препарата, стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

*Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь*

Действующие компоненты Депантола® (суппозитории вагинальные) – хлоргексидин и декспантенол – в применяемых концентрациях не оказывают существенного ингибирующего действия на нормальную микрофлору влагалища. Депантол® сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

Не описана.

Показания к применению

Лечение острых и хронических вагинитов; эндо/экзоцервицитов, в том числе осложненных эктопией эпителия шейки матки.

Лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии).

Препарат применяется для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктирующих методов лечения (диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.

Вводить по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Частота развития побочных эффектов классифицирована согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения:

очень часто - $\geq 10/100$

часто - от $\geq 1/100$ до $< 1/10$

иногда - $\geq 1/1000$ до $< 1/100$



редко - от $\geq 1/10000$ до $< 1/1000$

очень редко - $< 1/10000$.

Иногда: кратковременное жжение и/или зуд во влагалище.

Редко: в редких случаях реакция непереносимости аллергической реакции.

Очень редко: местное применение хлоргексидина может вызывать реакции повышенной чувствительности, включая тяжёлые аллергические реакции и анафилаксию.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка

Сведения о случаях передозировки лекарственного средства Депантол[®] суппозитории вагинальные не поступали.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация), не следует применять одновременно с другими антисептиками, вводимыми интравагинально.

Депантол[®] не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Депантол[®] проконсультируйтесь с врачом.

Меры предосторожности

При появлении побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов.

До и после применения препарата следует вымыть руки.

Применение при беременности и лактации

Специальных клинических исследований по применению Депантола[®] у беременных женщин и в период грудного вскармливания не проводилось. Исследования на лабораторных животных не продемонстрировали вредного воздействия декспантенола и хлоргексидина на течение беременности, развитие эмбриона, роды или послеродовый период.



Применение при беременности и в период лактации допустимо в случае, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.

Применение в педиатрической практике

Данные о применении препарата у детей отсутствуют.

Применение у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет)

Данные о применении препарата у пациентов пожилого возраста отсутствуют.

Применение у пациентов с нарушением функции почек

Данные о применении препарата у пациентов с нарушением функции почек отсутствуют.

Применение у пациентов с нарушением функции печени

Данные о применении препарата у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют.

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами

Не влияет.

Упаковка

Суппозитории вагинальные 100мг+16мг. 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C.

В недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7,

тел.: (831) 278-80-88, факс: (831) 430-72-28.

E-mail: med@stada.ru

