

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Амоксикар Плюс, 500 мг/125 мг, таблетки, покрытые оболочкой**Амоксикар Плюс, 875 мг/125 мг, таблетки, покрытые оболочкой****Амоксициллин с ингибитором бета-лактамаз**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.


Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Амоксикар Плюс и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Амоксикар Плюс
3. Прием препарата Амоксикар Плюс
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Амоксикар Плюс
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ АМОКСИКАР ПЛЮС И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Амоксикар Плюс – это антибиотик, который содержит амоксициллин и клавулановую кислоту.


Амоксициллин способен воздействовать на широкий спектр бактерий. Однако существуют бактерии, которые вырабатывают специальные ферменты (бета-лактамазы), разрушающие амоксициллин и препарат не может на эти бактерии воздействовать. Клавулановая кислота способна связывать и инактивировать данные ферменты, предотвращая разрушение амоксициллина. Таким образом, она обеспечивает устойчивость амоксициллина к воздействию бета-лактамаз.

Это позволяет препарату Амоксикар Плюс воздействовать на большее количество разновидностей бактерий, включая бактерии, на которые обычный амоксициллин или другие пенициллины не способны воздействовать.

Показания к применению

Амоксикар Плюс показан для лечения следующих инфекций у взрослых и детей:

- Острый бактериальный синусит (адекватно диагностированный)
- Острый средний отит
- Обострения хронического бронхита (адекватно диагностированные)
- Внебольничная пневмония
- Цистит
- Пиелонефрит
- Инфекции кожи и мягких тканей, в частности, флегмона, укусы животных, тяжелый дентальный абсцесс с распространяющейся флегмой
- Инфекции костей и суставов, в частности, остеомиелит



Следует принимать во внимание официальные рекомендации по рациональному применению антибактериальных средств.

Если улучшение не наступило, или вы чувствуете ухудшение, вам необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА АМОКСИКАР ПЛЮС

Не применяйте препарат Амоксикар Плюс:

- если у вас аллергия на амоксициллин, клавулановую кислоту или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша, включая арахис или сою;
- если у вас была тяжелая аллергическая реакция на антибиотики, относящиеся к группе бета-лактамных антибиотиков (например, цефалоспорины, карбапенемы или монобактамы);
- если у вас была желтуха или нарушения функции печени, развившихся на фоне применения амоксициллина/клавулановой кислоты.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Амоксикар Плюс проконсультируйтесь с лечащим врачом. Сообщите лечащему врачу если у вас есть одно из перечисленных обстоятельств:

- ранее у вас была аллергическая реакция на антибиотик группы пенициллинов, цефалоспоринов или на другой бета-лактамный антибиотик;
- инфекционный мононуклеоз;
- вы принимаете аллопуринол;
- в начале лечения у вас появилась кожная сыпь;
- у вас есть нарушение функции почек или печени;
- у вас снизился диурез (частота и объем мочеиспускания);
- во время длительной терапии рекомендуется периодически оценивать функцию систем органов, включая функцию почек, печени и кроветворения;
- если у вас во время или после лечения появились боли в животе, диарея, стул с прожилками крови;
- у пациентов с нарушением функции почек или при приеме высоких доз препарата могут возникать судороги.



В некоторых случаях ваш врач может определить тип бактерий, вызывающих инфекцию. В зависимости от результатов вам могут назначить Амоксикар Плюс другой дозировки или другой лекарственный препарат.

Состояния, на которые нужно обратить внимание

Амоксикар Плюс может ухудшить некоторые существующие состояния или вызвать серьезные нежелательные реакции. К ним относятся аллергические реакции, судороги и воспаление толстой кишки. Вы должны следить за появлением определенных симптомов во время приема Амоксикиара Плюс, чтобы снизить риск возникновения каких-либо проблем. См. «Состояния, на которые следует обратить внимание» в разделе 4.

Влияние на анализы крови и мочи:

- изредка у пациентов, получавших амоксициллин в комбинации с клавулановой кислотой, отмечалось удлинение протромбинового времени. При одновременном приеме антикоагулянтов необходим соответствующий контроль;
- во время лечения амоксициллином некоторые тесты на глюкозу в моче могут давать ложноположительный результат. Сообщите лечащему врачу, что вы принимаете Амоксикар Плюс если вам назначили тест на глюкозу в моче;
- при применении комбинации амоксициллина/клавулановой кислоты возможна ложноположительная реакция Кумбса и ложноположительный результат ИФА теста на Aspergillus.

Дети и подростки

В связи с тем, что таблетка Амоксикар Плюс не может быть разделена, не рекомендуется применять данную форму лекарственного препарата у детей с массой тела менее 25 кг. Для детей в возрасте 6 лет и менее или с массой тела менее 25 кг следует применять Амоксикар Плюс в форме суспензии.

Другие препараты и препарат Амоксикар Плюс

Сообщите лечащему врачу о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, особенно препараты, перечисленные ниже:

- Если вы принимаете лекарства, которые предотвращают образование тромбов (например, варфарин). Вам могут потребоваться дополнительные анализы крови;
- Если вы принимаете метотрексат (лекарство, используемое для лечения рака и тяжелого псориаза). Одновременное применение с пенициллинами может снижать экскрецию метотрексата, вызывая потенциальное повышение развития нежелательных реакций;
- Если вы принимаете микофеинолат мофетил (лекарство, используемое для предотвращения отторжения пересаженных органов);
- Если вы принимаете аллопуринол (используется для лечения подагры), одновременный прием повышает риск аллергической реакции;
- Если вы принимаете пробенецид (применяется для лечения подагры). Не рекомендуется одновременное применение с пробенецидом, так как может снижаться экскреция амоксициллина.

Препарат Амоксикар Плюс с пищей

Прием Амоксициллина Плюс непосредственно с приемом пищи помогает уменьшить риск желудочно-кишечной непереносимости, и улучшает всасывание препарата.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность: следует избегать приема лекарственного препарата во время беременности, за исключением тех случаев, когда врач считает прием необходимым.



Грудное вскармливание: комбинация амоксициллин/клавулановая кислота может применяться во время грудного вскармливания только после оценки пользы/риска лечащим врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Специальных исследований не проводилось. Однако возможно возникновение побочных реакций (аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут оказывать влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (менее 23 мг) в одной таблетке, т.е., по существу, «свободно от натрия».

Лекарственный препарат содержит соевый лецитин, поэтому пациентам с аллергией на арахис или сою не следует принимать данный лекарственный препарат.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА АМОКСИКАР ПЛЮС

Всегда принимайте препарат Амоксикар Плюс в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Расчет дозы ведется по амоксициллину и клавулановой кислоте.

При выборе дозы лекарственного препарата Амоксикар Плюс для лечений конкретной инфекции необходимо учитывать:

- вероятных возбудителей и их ожидаемую чувствительность к антибактериальным средствам;
- степень тяжести и локализацию инфекции;
- возраст, массу тела и состояние почечной функции пациента (см. ниже).

При необходимости следует рассмотреть возможность назначения других лекарственных форм препарата Амоксикар Плюс (в том числе с иным содержанием амоксициллина и/или другим соотношением амоксициллина/клавулановой кислоты).

У взрослых и детей с массой тела 40 кг и более Амоксикар Плюс (500 мг/125 мг) обеспечивает общую суточную дозу 1500 мг амоксициллина/375 мг клавулановой кислоты; Амоксикар Плюс (875 мг/125 мг) обеспечивает общую суточную дозу 1750 мг амоксициллина/250 мг клавулановой кислоты при условии приема 2 раза в день, а также 2625 мг амоксициллина/375 мг

7832 - 2020

claveulanovoy kisloty pri prieme 3 raz v den' pri uslovii соблюдения rekomendacij po primeneniju, ukazanых niже.

U detej s massoj tela menee 40 kg Amoksikar Plus (500 mg/125 mg) obespechivaet maksimal'nuyu sutochnuyu dozu 2400 mg amoksiçillina/600 mg claveulanovoy kisloty; Amoksikar Plus (875 mg/125 mg) obespechivaet maksimal'nuyu sutochnuyu dozu 1000 - 2800 mg amoksiçillina/143 - 400 mg claveulanovoy kisloty pri uslovii соблюдения rekomendacij, ukazanых niже.

Dlitel'nost' lechenija opredеляetsja klinicheskoy kartinoy. Nekotorye infekcii (naprimer, osteomielit) требуют bol'se prodrozhitel'nogo lechenija. Lечение ne sleduet prolongirat dольше 14 dnей bez peresmotra klinicheskoy situacii.

Vzroslye i deti s massoj tela 40 kg i bol'se:

1 tabletka 500 mg/125 mg 3 raz v den'.

1 tabletka 875 mg/125 mg 2 raz v den' - dla vseh pokazanij; 1 tabletka 875 mg/125 mg 3 raz v den' - v chasnosti, pri srednjem otite, sinusite, воспалeniyakh nizhnix dыхatel'nykh putej i infekcii mochevivodящих putej.

Deti s massoj tela menee 40 kg:

Amoksikar Plus (500 mg/125 mg): obshaya doza, sostavляющая ot 20 mg/5 mg/kg/den' do 60 mg/15 mg/kg/den', razdelennaya na 3 priema.

Amoksikar Plus (875 mg/125 mg): obshaya doza, sostavляющая ot 25 mg/3,6 mg/kg/den' do 45 mg/6,4 mg/kg/den', razdelennaya na 2 priema; dla lechenija nekotoryx infekcij (naprimer, srednij otit, sinusit i infekcii nizhnix dыхatel'nykh putej) – do 70 mg/10 mg/kg/den' v 2 priema.

V svязi s tem, cto tabletka Amoksikar Plus ne может быt' razdelena, ne rekomenduetsja назначать danную formu lekarstvennogo препарата detjam s massoj tela menee 25 kg. Detjam v vozraste 6 let i menee ili s massoj tela menee 25 kg sleduet назначать Amoksikar Plus v formе suspenzii.

Nizhe v tablitshe privedeny dozy (mg/kg massy tela), poluchennye pri prieme odnoj tabletki (500 mg/125 mg) /odnoj tabletki (875 mg/ 125 mg) u detej s massoj tela ot 25 kg do 40 kg.

Massa tela (kg)	40	35	30	25	Rekomendovan-naia odnokratnaya doza (mg/kg massy tela)
Amoksikar Plus (500 mg/125 mg)					
Amoksiçillin (mg/kg massy tela) v odnokratnoj doze (1 tabletka, pokrytaa obolochkoj)	12.5	14.3	16.7	20.0	6.67-20

7832 - 2020

Клавулановая кислота (мг/кг массы тела) в однократной дозе (1 таблетка, покрытая оболочкой)	3.1	3.6	4.2	5.0	1.67-5
Амоксикар Плюс (875 мг/125 мг)					
Амоксициллин (мг/кг массы тела) в однократной дозе (1 таблетка, покрытая оболочкой)	21.9	25.0	29.2	35.0	12.5-22.5 (до 35)

Пожилые пациенты:

Не требуется коррекции режима дозирования.

Пациенты с нарушением функции почек:

Методика подбора дозы основывается на максимально возможном уровне амоксициллина при определенной степени снижения клиренса креатинина.

У пациентов с клиренсом креатинина более 30 мл/мин коррекция режима дозирования не требуется.

Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг

Клиренс креатинина 10-30 мл/мин: доза 500 мг/125 мг - 2 раза в день.

Клиренс креатинина менее 10 мл/мин: доза 500 мг/125 мг - 1 раз в день.

Амоксикар Плюс (875 мг/125 мг) назначается только для лечения больных с клиренсом креатинина >30 мл/мин. При почечной недостаточности с клиренсом креатинина < 30 мл/мин Амоксикар Плюс (875 мг/125 мг) не применяют.

Гемодиализ: доза 500 мг/125 мг каждые 24 часа, дополнительно 500 мг/125 мг во время сеанса в конце диализа (учитывая снижение концентраций амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке крови).

Дети с массой тела менее 40 кг

Клиренс креатинина 10-30 мл/мин: доза 15 мг/3.75 мг/кг дважды в день (максимально 500 мг/125 мг дважды в день).


Клиренс креатинина менее 10 мл/мин: однократная суточная доза - 15 мг/3.75 мг/кг (максимально 500 мг/125 мг).

Гемодиализ: доза 15 мг/3.75 мг/кг в день однократно.

Перед гемодиализом: доза 15 мг/3.75 мг/кг. Для восстановления уровня лекарственного препарата в плазме крови после гемодиализа следует принять дозу 15 мг/3.75 мг/кг.

Печеночная недостаточность:

Лечение проводят с осторожностью, при регулярном контроле функции печени через равные интервалы времени.



Способ применения

Амоксикар Плюс предназначен для перорального приема. Лекарственный препарат принимают непосредственно с приемом пищи, что помогает минимизировать риск развития желудочно-кишечной непереносимости, а также оптимизировать абсорбцию амоксициллина/клавулановой кислоты. При необходимости возможно проведение ступенчатой терапии (вначале внутривенное введение препарата с последующим переходом на пероральный прием).

Если вы приняли препарата Амоксикар Плюс больше, чем следовало

Если Вы или Ваш ребенок приняли больше Амоксикар Плюс чем следовало, немедленно обратитесь к своему врачу. Передозировка может вызвать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (такие как тошнота, рвота и диарея) и нарушения водного и электролитного баланса.

Сообщалось о случаях развития кристаллурии после передозировки амоксициллина, которая в некоторых случаях приводила к почечной недостаточности.

У пациентов с почечной недостаточностью или принимающих высокие дозы амоксициллина возможны судороги.

Сообщалось об осаждении амоксициллина в катетерах в мочевом пузыре, преимущественно после внутривенного введения высоких доз, поэтому следует контролировать проходимость катетеров у таких пациентов.

В случае передозировки рекомендуется промывание желудка, назначение активированного угля и солевых слабительных, коррекция водно-электролитного баланса, адекватный прием жидкости и поддержание диуреза (для снижения риска кристаллурии). Избыточное количество амоксициллина/клавулановой кислоты может быть удалено из циркулирующей крови гемодиализом.

Если вы забыли принять препарат Амоксикар Плюс

Если Вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. Вы не должны принимать следующую дозу слишком рано, подождите около 4 часов, прежде чем принимать следующую дозу. Не удваивайте дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием препарата.

Если вы прекратили прием препарата Амоксикар Плюс

Не прекращайте лечение по своему усмотрению, например, если вы чувствуете себя лучше. Если прием Амоксикар Плюс прекратить слишком рано, возможно, что инфекция может возобновиться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.


4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам Амоксикар Плюс может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Большинство неблагоприятных эффектов проявляются в легкой степени и являются временными.

Состояния, на которые следует обратить внимание

Аллергические реакции:

- кожная сыпь;
- воспаление кровеносных сосудов (васкулит), которое может проявляться в виде красных или пурпурных пятен на коже, но может повлиять на другие части тела;
- лихорадка, боль в суставах, увеличение лимфатических узлов на шее, в подмыщечных впадинах или в паху;
- отек, иногда лица или горла (англоневротический отек), вызывающий затруднение дыхания;
- коллапс (угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением артериального давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов);
- боль в груди на фоне аллергических реакций, которая может быть симптомом инфаркта миокарда, спровоцированного аллергической реакцией (синдром Коуниса).



Воспаление толстой кишки

Воспаление толстой кишки, вызывающее водянистую диарею, обычно с кровью и слизью, боль в желудке и/или лихорадка.

Острое воспаление поджелудочной железы (острый панкреатит)

Если вы испытываете сильную и постоянную боль в области живота, то это может быть признаком острого панкреатита.

Синдром лекарственного энтероколита (СЛЭ)

О СЛЭ сообщалось в основном у детей, получавших амоксициллин/клавуланат. Это определенный вид аллергической реакции с

ведущим симптомом повторяющейся рвоты (через 1-4 часа после приема препарата). Дополнительные симптомы могут включать боль в животе, вялость, диарею и низкое кровяное давление.

Немедленно прекратите принимать Амоксикар Плюс и обратитесь к врачу, если у вас возникнут какие-либо из перечисленных выше состояний.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Очень часто (могут возникать не менее чем у 1 человека из 10):

- диарея (у взрослых).

Часто (могут возникать менее чем у 1 человека из 10):

- молочница (кандидоз - грибковая инфекция влагалища, ротовой полости или кожных складок);
- тошнота, особенно при применении высоких доз.
В случае появления тошноты принимайте препарат во время приема пищи;
- рвота;
- диарея (у детей).

Нечасто (могут возникать менее чем у 1 человека из 100):

- сыпь, зуд;
- крапивница;
- расстройства пищеварения;
- головокружение;
- головная боль;
- повышение уровня печеночных ферментов в крови.



Редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 1000):

- высыпания на коже, которые могут быть в виде волдырей и выглядеть как маленькие мишени (центральные темные пятна, окруженные более светлым участком, с темным кольцом по краю (мультиформная эритема). **Немедленно обратитесь к врачу в случае развития признаков мультиформной эритемы.**
- уменьшение количества тромбоцитов или лейкоцитов в крови.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции (см. выше);
- воспаление толстой кишки (см. выше);
- серьезные кожные реакции:

- распространенная сыпь с волдырями и шелушением кожи, особенно вокруг рта, носа, глаз и наружных половых органов (синдром Стивенса-Джонсона) и более тяжелая форма, при которой наблюдается сильное шелушение кожи (более 30 % поверхности тела - токсический эпидермальный некролиз);
- сыпь красного цвета с гнойничками, покрывающая значительные участки (буллезный эксфолиативный дерматит);
- сыпь красного цвета с подкожными уплотнениями и волдырями (экзантематозный пустулез);
- гриппоподобные симптомы с сыпью, лихорадкой, опуханием желез и отклонениями результатов анализа крови (включая увеличение количества лейкоцитов (эозинофилия) и повышение уровня ферментов печени);
- лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами.
- Сыпь с везикулами и пузырями с корками в центре, с тенденцией к группировке и образованию гирляндоподобной формы или в виде «нитки жемчуга» (IgA зависимый линейный дерматоз).
- Воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг (асептический менингит).

Немедленно обратитесь к врачу в случае развития вышеуказанных симптомов.



- воспаление печени (гепатит);
- желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
- воспаление канальцев почек (интерстициальный нефрит);
- удлинение времени свертывания крови;
- гиперактивность;
- судороги (при высоких дозах препарата или при наличии проблем с почками);
- черный «волосятый» язык;

Нежелательные реакции, которые могут обнаруживаться при проведении анализов крови или мочи:

- значительное снижение количества лейкоцитов в анализе крови;
- понижение количества эритроцитов (гемолитическая анемия) в анализе крови;
- кристаллы в моче, приводящие к острому повреждению почек.

Если вы отмечаете любой из указанных симптомов, прекратите прием препарата и обратитесь к лечащему врачу.



Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов на веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АМОКСИКАР ПЛЮС

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25° С. Использовать в течение 15 дней после вскрытия.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Амоксикар Плюс содержит

Амоксикар Плюс таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг / 125 мг

Каждая таблетка содержит:


действующие вещества:

- амоксициллин 500 мг (в виде тригидрата),
- клавулановая кислота 125 мг (в виде клавуланата калия);

вспомогательные вещества: кроскармеллоза натрия, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, тальк порошок, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон XL, повидон ПВП К30, опадрай АМВ ОY-B-28920 белый (частично гидролизованный поливиниловый спирт, титана диоксид, тальк, соевый лецитин, ксантановая камедь).

Амоксикар Плюс таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг / 125 мг

7832 - 2020



Каждая таблетка содержит:
действующие вещества:

- амоксициллин 875 мг (в виде тригидрата),
 - клавулановая кислота 125 мг (в виде клавуланата калия);
- вспомогательные вещества: кроскармеллоза натрия, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, тальк порошок, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон XL, повидон ПВП К30, опадрай АМВ ОУ-В-28920 белый (чаще гидролизованный поливиниловый спирт, титана диоксид, тальк, соевый лецитин, ксантановая камедь).

Внешний вид препарата Амоксикар Плюс и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг /125 мг: овальные таблетки, покрытые оболочкой белого цвета. Допускаются неровности поверхности и краев таблеток.

Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг /125 мг: овальные таблетки, покрытые оболочкой белого цвета. Допускаются неровности поверхности и краев таблеток.

Амоксикар Плюс 500 мг / 125 мг таблетки, покрытые оболочкой: по 20 таблеток во флаконе из ПЭВП с влагопоглотителем, по 1 флакону упаковано в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению для пациентов.

Амоксикар Плюс 875 мг / 125 мг таблетки, покрытые оболочкой: по 14 таблеток во флаконе из ПЭВП с влагопоглотителем, по 1 флакону упаковано в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению для пациентов.

Информация о производителе

БФК, Палестина для Фармакар Инт. Ко. / Германо-Палестинское Совместное предприятие

Палестина, Иерусалим, п/о, а/я 51621.

Представительство компании «Фармакар ПЛС» в Республике Беларусь:
г.Минск, 220020 а/я 7.

e-mail: pharmacare@pharmacare.by

Сайт: www.pharmacare.by

Отпуск из аптек

Отпускают из аптек по рецепту.

Листок-вкладыш пересмотрен

НД РБ

Ноябрь 2023 г.

7832 - 2020

