

# Листок-вкладыш – информация для пациента НЧД РБ

## ПЕПСАН-Р, капсулы

гвайазулен, диметикон

8051 - 2016

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Данный лекарственный препарат отпускается по рецепту врача.

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

от «05» 09 2016 № 1161

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

## СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

- Что из себя представляет препарат Пепсан-Р, и для чего его применяют
- О чём следует знать перед приемом препарата Пепсан-Р
- Прием препарата Пепсан-Р
- Возможные нежелательные реакции
- Хранение препарата Пепсан-Р
- Содержимое упаковки и прочие сведения

## 1. Что из себя представляет препарат Пепсан-Р, и для чего его применяют

Препарат Пепсан-Р содержит действующие вещества гвайазулен и диметикон. Гвайазулен – обладает противовоспалительным эффектом.

8051 - 2016

СОГЛАСОВАНО

С НИЗКИМ ЗАПАКОВОЧНЫМ

ПОВЕРХНОСТНЫМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОКРЫВАЮЩЕЕ

РЕСПУБЛИКИ Беларусь

Диметикон – гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и обладает защитной пленкой стенки пищеварительного канала, обладает противовспенивающим действием.

За счёт комбинации действующих веществ препарат оказывает противовоспалительное действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

### **Показания к применению**

Препарат Пепсан-Р применяется для симптоматического лечения функциональных расстройств, сопровождающихся болями при эзофагогастродуodenальных заболеваниях (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) у взрослых.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### **2. О чём следует знать перед приемом препарата Пепсан-Р**

#### **Противопоказания.**

Не принимайте препарат Пепсан-Р, если у Вас аллергия на гвайазулен и диметикон или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

#### **Особые указания и меры предосторожности.**

Перед приемом препарата Пепсан-Р проконсультируйтесь с лечащим врачом.

#### **Дети и подростки.**

Не давайте препарат детям в возрасте 18 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности лекарственного препарата в данной возрастной группе.

#### **Другие препараты и препарат Пепсан-Р.**

8051 - 2016 ГЛАСОВАНО

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта врача.

Взаимодействий с другими лекарственными препаратами не выявлено.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат Пепсан-Р можно применять во время беременности и грудного вскармливания.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

### **Препарат Пепсан-Р содержит сорбитол**

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

### **Препарат Пепсан-Р содержит глицерол (глицерин) (29,5 мг)**

Может вызвать головную боль, расстройство желудка и диарею (понос).

### **3. Прием препарата Пепсан-Р**


Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза: 1 капсула.

Максимальная суточная доза: 4 капсулы. **Прием большего количества препарата не улучшает состояние!**

8051 - 2016

Препарат принимают внутрь, запивая половиной стакана воды, при возникновении боли.



### **Если Вы приняли препарата Пепсан-Р больше, чем следовало**

У Вас могут проявиться нежелательные реакции, описанные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Если Вы забыли принять Пепсан-Р**

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную капсулу.

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам Пепсан-Р может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Редко** – могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000:

- аллергические реакции, такие как сыпь, зуд кожи;
- боли и вздутие живота.

### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Форма извещения о нежелательной реакции на сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by)

### **5. Хранение препарата Пепсан-Р**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

НД РБ



8051 - 2016

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Действующими веществами являются гвайазулен и диметикон.

Каждая капсула содержит гвайазулена 4 миллиграмма и диметикона 300 миллиграмм.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: желатин, глицерин, сорбитол жидкий 70 % некристаллизующийся, патентованный синий V(E131), титана диоксид (E171), вода очищенная.

### Внешний вид препарата Пепсан-Р и содержимое упаковки


Капсулы №5 синего цвета, мягкие, продолговатые, блестящие.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке.

По 3 контурные ячейковые упаковки с инструкцией (листком-вкладышем) в картонной пачке.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель:**

Держатель регистрационного удостоверения и выпуск серии:



Лаборатории МАЙОЛИ СПИНДЛЕР  
6 Авеню Европы  
78400 Шату  
Франция

8051 - 2016

Производитель готовой лекарственной формы:

Лаборатории Галеник Вернин  
20, рю Луи-Шарль Вернин  
77190 Даммари Ле Лис  
Франция

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к уполномоченному лицу держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь  
ООО «МАЙОЛИ БЕЛА»  
Республика Беларусь, 220020, Минск, пр-т Победителей, д. 103, офис 904  
Тел.: +375 17 308 75 39  
Факс: +375 17 308 75 39  
Адрес электронной почты: mayoly.belarus@mayoly.by

**Данный листок-вкладыш пересмотрен**  
**ММ/ГГГГ**