

27.04.2017
A

НД РБ

8537 - 2017

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 26.05.2017 № 51

Энтерокинд
капли для внутреннего применения.

Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть Вам понадобится прочитать его ещё раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Основные физико-химические свойства

Прозрачный бесцветный вязкий раствор.

Состав

В 20 мл раствора содержится:

активные вещества: Chamomilla (Ромашка аптечная) D6 2,36 г, Cina (Цина) D6 2,36 г, Colocynthis (Колоцинт обыкновенный) D6 2,36 г, Lac defloratum (Лак дефлоратум) D6 2,36 г, Magnesium chloratum (Магния хлорид) D6 2,36 г;

вспомогательные вещества: ксилит, глицерин 85%, вода очищенная.

Лекарственное средство содержит 3,1 % (об./об.) этанола, то есть 2,8 мг на разовую дозу (3 капли).

Лекарственная форма

Капли для внутреннего применения.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при функциональных расстройствах кишечника и метеоризме.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит небольшое количество этанола - 2,8 мг на разовую дозу (3 капли).

Беременность и кормление грудью.

ЭНТЕРОКИНД не предназначен для применения взрослыми.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Лекарственное средство предназначено для детей.

Способ применения и дозировка

Всегда применяйте ЭНТЕРОКИНД так, как Вам сказал Ваш врач или фармацевт. Если Вы не уверены в чём либо, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Обычно препарат применяют так, как это описано ниже.

Дети до 6 лет:

При острых симптомах по 3 капли через каждый час не более 6 раз в день; после ослабления симптоматики по 3 капли 3 раза в день.

Капли следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды. При необходимости капли можно смешивать с небольшим количеством воды. Продолжительность лечения 3-6 дней.

ЭНТЕРОКИНД не рекомендуется принимать вместе с едой. Капли лучше всего принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Не давайте Вашему ребёнку двойную дозу, чтобы возместить пропущенный приём препарата.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

Примечание: При приёме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить применение данного лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте ЭНТЕРОКИНД после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и на флаконе.

Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

НД РБ

8537 - 2017

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Упаковка и её содержимое

Капли для внутреннего применения, раствор в стеклянных флаконах по 20 мл, упакованных вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Фирма-производитель, адрес



Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

Представитель в Республике Беларусь

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
тел/факс (+375 17) 3350642.